

Benebeo

GEL RETTALE



**Complemento cosmetico
utile in presenza di
alterazioni del derma
nella zona peri-anale**

POSOLOGIA E MODALITA' DI IMPIEGO
Detergere l'ano e la zona circostante.

Per la prevenzione

Si consiglia di applicare il prodotto 1-2 volte al giorno, per migliorare l'elasticità dei tessuti anali e perianali. La dose raccomandata è una quantità di gel sufficiente a ricoprire la parte interessata.

Per il trattamento

La dose raccomandata è una quantità di gel sufficiente a ricoprire la parte interessata, da applicare 2-3 volte al giorno, per un periodo che deve estendersi almeno a tre settimane al fine di registrare dei miglioramenti concreti. Applicazione esterna: applicare una quantità di gel sufficiente a ricoprire la parte interessata; spalmare e massaggiare lievemente. Per un uso corretto servirsi dei ditalini monouso.

Durata del trattamento

Applicare il prodotto per il periodo necessario, fino alla scomparsa dei sintomi. Se il sintomo persiste consultare il proprio medico.

AVVERTENZE

Uso esterno - Non ingerire.
Richiudere perfettamente dopo l'uso. Non utilizzare se si è allergici a uno dei componenti. Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore

FORMATO

Tubo da 50 ml

- ✓ ALLEVIA L'INFIAMMAZIONE
- ✓ ALLEVIA DOLORE, PRURITO, BRUCIORE
- ✓ MIGLIORARE L'ATTIVITÀ DEI VASI SANGUIGNI E RIDUCE IL GONFIORE
- ✓ FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE

QUANDO E' INDICATO

Nei processi di normalizzazione e riparazione della mucosa anale

Nei casi di infiammazione aspecifica della zona ano-rettale

Nelle emorroidi, nelle ragadi anali e nelle proctiti

COMPOSIZIONE QUALITATIVA [INCI]

Bergamot Polyphenolic Fraction (estratto bergamotto titolato in flavonoidi del Bergamotto: esperidina, naringina, apigenina, eriocitrina), bergamotto (esente da bergapteni), Pantenolo, Sodio ialuronato, Gomma xantana. Acqua e conservanti.




Nuovo approccio diagnostico-terapeutico nella patologia infiammatoria del canale anale.

Studio comparativo mesalazina VS mesalazina + frazione flavonoide del bergamotto¹

Materiali e metodi

60 pazienti con proctite idiopatica sono stati arruolati in uno studio con doppio cieco sull'effetto della mesalazina per uso topico rispetto alla combinazione di mesalazina e il gel a base di bergamotto. I pazienti sono stati trattati per 30 giorni e valutati a T0-T1 (30 g) -T2 (90 g) con Digital Videoproctoscopy, misurando

- ✓ il dolore con punteggio da 0 a 10;
- ✓ l'iperemia con punteggio da 0 a 3 (assente, lieve, moderata);
- ✓ il sanguinamento con punteggio da 0 a 3 (assente, lieve, moderata, intensa).



Risultati

Gruppo di pazienti trattati con solo mesalazina: gli effetti benefici su dolore, iperemia e sanguinamento sono stati temporanei con un recupero parziale dei sintomi dopo un anno.

Gruppo dei pazienti trattati con Benebeo gel topico: si è assistito ad un miglioramento significativo della sintomatologia a distanza di un mese di trattamento con completa risoluzione del quadro flogistico mantenuto entro l'anno.

PROPRIETA' DEI PRINCIPALI COMPONENTI



AZIONE ANTINFIAMMATORIA

Flavonoidi del Bergamotto

Recentemente è stata dimostrata come la frazione flavonoidica di Bergamotto riduca la risposta infiammatoria indotta attraverso l'inibizione di NF-KB, la soppressione dell'espressione della cicloossigenasi-2 (COX-2) e la diminuzione delle specie reattive di ossigeno. L'esperidina, la naringina, l'apigenina, l'eriocitrina e l'olio essenziale di bergamotto svolgono attività anti-infiammatorie attraverso attività radical-scavenging e anti-infiammatorie.

Olio essenziale di Bergamotto

Possiede proprietà antiinfiammatorie, antibatteriche, analgesiche, favorendo l'eliminazione dalla mucosa anale e rettale di tossine e agenti batterici spesso causa di quadri flogistici aspecifici.



AZIONE VASOPROTETTIVA

Olio essenziale di Bergamotto

Le virtù riscaldanti del Bergamotto aiutano a riattivare la circolazione sanguigna nella zona peri-anale e ad aumentare la resistenza dei vasi sanguigni.

Flavonoidi del Bergamotto

I flavonoidi del Bergamotto, in particolare l'esperidina possiede una spiccata attività antiossidante, capillarotropica e vasoprotettiva, che ne ha facilitato la diffusione in commercio come agente vasoprotettivo.

La naringina e l'apigenina riducono la fragilità capillare rafforzando la matrice dermica che sostiene la rete microvascolare.



AZIONE ANESTETICA LOCALE

Pantenolo

Oltre alle note proprietà idratanti, il pantenolo è indicato anche per l'attività emolliente e lenitiva.

Acido Jaluronico

La proprietà principale dell'Acido ialuronico (Sodio Ialuronato) è quella di legare un elevato numero di molecole di acqua garantendo l'idratazione della cute. Ha un intenso potere idratante e proprietà nutrienti, emollienti e lenitive.



AZIONE CICATRIZZANTE

Olio essenziale di Bergamotto

L'Olio Essenziale di Bergamotto annovera proprietà antibatteriche e disinfettanti e cicatrizzanti.

Flavonoidi del Bergamotto

L'apigenina riducono la fragilità capillare rafforzando la matrice dermica che sostiene la rete microvascolare. Di conseguenza, riduce la degradazione del collagene della matrice dermica. L'eriocitrina migliora il trofismo dei tessuti di sostegno attraverso una ampia rigenerazione epiteliale

Acido Jaluronico

Agevola la riparazione e cicatrizzazione dei tessuti.

Pantenolo

Stimola la rigenerazione della pelle e la idrata. Contribuisce alla cicatrizzazione di possibili ferite nella zona perianale.

1. Nuovo approccio diagnostico-terapeutico nella patologia infiammatoria del canale anale. Affiliazioni: UCP Ambulatorio Athena Vibo Valentia; Dipartimento di farmacia e scienze della nutrizione UNICAL CS.